

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התש"מ - 1986  
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה  
פורטט עלון זה ניקבע ע"י משרד הבריאות ותכנון נידבק ואושר על ידו ב-02/2012.

## ואלטון טיפות

הרכב:

Valerian dry extract 25 mg

כל 1 מ"ל (20 טיפות) מכיל:

**חומרים בלתי פעילים:**

Ethanol 95%, Propylene glycol, Methylparaben, Potassium sorbate,  
Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil (CREMOPHOR RH 40) Purified  
Water.

מכיל אלקהול 250 מ"ג/מ"ל

**פעילות תרופתית:** התרופה מיועדת להרגעה במצבים של מתח  
ועצבנות.

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לואלריאן או לאחד ממרכיבי  
התרופה.  
אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12.

**אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול:**

אם הינך בהריון או מניקה.

**איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?**

השימוש בתרופה זו עלול לפגוע בעירומת במשך היום ועל כן מחייב  
זהירות בנהיגה, ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות  
המחייבת ערנות.

אין לשתות יינות או משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול עם התרופה.

**אזהרות:**

אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי  
היוועץ ברופא.

אם הינך רגיש/ה למוזן כלשהוא או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך  
לרופא לפני נטילת התרופה.

**תגובות בין-תרופתיות:**

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם  
ותוספי תזונה, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח  
לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין  
תרופתיות. במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נוספות  
להשריית שינה, תרופות נגד חרדה, משכבי כאבים נרקוטיים, תרופות  
נוספות להרגעה, תרופות לאיפילסיה, אלקהול, לופרמיד, לוראזפם  
ותרופות שגורמות לרעילות של הכבד.

**תופעות לוואי:**

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות  
להופיע תופעות לוואי כגון: בחילה, כאב ראש, חרדה ורעילות של הכבד  
במשתמשים בתקופה ממושכת.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם  
חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:**

למבוגרים וילדים מעל גיל 12:

20-40 טיפות (1-2 מ"ל) לפי הצורך או לפי הוראות הרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

**התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.**

**אופן השימוש:**

מהלך את התרופה בכוס מים.

**מנעי/ה הרעלה:**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של  
ילדים ולא תימנות ועל יד-יך-תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם טבעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר  
המיני של בית-חולים, והבא את אריזת התרופה המקורית איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך  
נוטל תרופה.

הרכבי משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**אחסנה:** בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש רק עד 18 חודש ובלבד שלא  
פג תקופה.

סגור היטב ומנע חדירת אויר ורטובות.

לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה  
מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה  
של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' ירושם התרופה:** 00-33169-47-147

**יצרן:** רקת תעשית תרופות בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון, ישראל.

מק"ט: 5VA1165A 02/13